

Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Processo Seletivo Público Simplificado n.º 001/2020 - Prova de Enfermagem

1. Após a instalação de um distúrbio acidobásico (DAB) simples, o organismo se utiliza dos sistemas reguladores para compensar a alteração e equilibrar o pH. Correlacione as principais compensações envolvidas nos DABs simples e assinale a alternativa que corresponde a sequência correta da resposta:

- A - Acidose metabólica (**A**) Hiperventilação para remover o excesso de CO_2 .
- B - Alcalose metabólica (**B**) Hipoventilação para aumentar a concentração de CO_2 .
- C - Acidose respiratória (**C**) Excreção de H^+ e reabsorção de HCO_3^- .
- D - Alcalose respiratória (**D**) Retenção de H^+ e excreção de HCO_3^- .

- A) B, A, C, D
B) A, B, D, C
C) C, D, A, B
D) A, B, C, D
E) B, A, D, C

2. Choque é definido como um distúrbio orgânico ameaçador a vida, caracterizado pelo suprimento insuficiente de sangue para os tecidos e as células do corpo. Por isso, quando se pensa em choque, deve-se ter em mente:

- A) Diminuição da Pressão Arterial.
B) Hipoperfusão Tecidual.
C) Disfunção Orgânica.
D) Somente alternativas A e B estão corretas.
E) Alternativas A, B e C estão corretas.

3. O traumatismo cranioencefálico (TCE) é qualquer agressão física que acarrete lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, do crânio, das meninges ou do encéfalo em qualquer combinação. Não faz parte do quadro clínico padrão do TCE:

- A) Perda da consciência que pode variar de minutos a anos.
B) Aumento da Pressão Intracraniana (PIC).
C) Sinal de Battle (Equimose pós-auricular).
D) Olhos de guaxinim (Equimose periorbitária).
E) Fístula licórica com perda de líquido céfalo espinal pelo nariz, olhos, boca e ouvido.

4. Relacionado às lesões de pele, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas frases abaixo:

- (**F**) As úlceras crônicas e extensas podem expor proeminências ósseas, com alto risco de desenvolver osteomielite, incomum nas infecções mais graves.
(**F**) A presença de tecido morto e de fluidos ricos em lipídios, na superfície queimada, favorece a colonização bacteriana.
(**V**) A vesícula presente na queimadura de segundo grau, superficial, serve como curativo biológico e pode ser mantida por até 72 horas. Depois desse período, propicia um meio de cultura bacteriana.
(**F**) Diversos fatores foram identificados como responsáveis pela redução da tolerância tissular à pressão. Eles são agrupados em três categorias: Fatores extrínsecos, intrínsecos e medianos.
(**F**) Lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, é resultante do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. Essas lesões devido à especificidade da anatomia, não podem ser categorizadas mediante o sistema de classificação da *National Pressure Ulcer Advisory Panel* (NPUAP).

- A) F, F, V, F, F**
B) F, F, V, F, V
C) V, V, V, F, V
D) F, F, F, V, F
E) Todas as alternativas são falsas.

5. Nos casos mais complexos, as queimaduras poderão comprometer outros sistemas corporais. Na fase inicial, devido às alterações fisiopatológicas (hipoperfusão e hipofunção orgânica) podem ocorrer disfunções orgânicas. Marque a alternativa que indique qual disfunção faz parte das complicações.

- A) Cardiovasculares
B) Hidroeletrólíticas
C) Pulmonares
D) Hemodinâmicas
E) Todas as alternativas estão corretas.

6. O local usado para acessar o pulso durante o choque fisiológico ou na parada cardíaca, quando outros locais não são palpáveis, localizado abaixo do ligamento inguinal, entre a sínfise púbica e a espinha ilíaca anterossuperior, é denominado:

- A) Temporal
B) Apical

Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Processo Seletivo Público Simplificado n.º 001/2020 - Prova de Enfermagem

- C) Poplíteo
- D) Femoral**
- E) Tibial Posterior

7. Relacionado aos padrões respiratórios, a respiração anormalmente profunda, regular e de alta frequência, é denominada:

- A) Respiração de Kussmaul**
- B) Hiperpnéia
- C) Respiração Cheyne-Stokes
- D) Hiperventilação
- E) Respiração de Biot

8. Relacionado às possíveis interferências nas pulsações arteriais, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) e indique a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo:

- (**V**) A doença vascular periférica (aterosclerose) reduz o volume de pulso.
- (**F**) Uma hipertermia no local da avaliação diminui a circulação sanguínea periférica.
- (**F**) Vasoconstrições farmacológicas (por exemplo: epinefrina) aumentam o volume de pulso periférico.
- (**V**) Débito cardíaco baixo e hipotensão diminuem a circulação sanguínea para as artérias periféricas.
- (**V**) O uso de oxímetro de pulso demasiadamente apertado, poderá registrar pulsações venosas no dedo que irão competir com as pulsações arteriais.

- A) F, V, V, V, V
- B) V, F, F, V, V**
- C) V, F, V, V, F
- D) V, F, V, F, V
- E) V, V, F, V, V

9. Situações onde o profissional de enfermagem promove ou é conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família, membros das equipes de Enfermagem e de saúde, organizações da Enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce sua atividade profissional, estará descumprindo a orientação descrita em:

- A) Na Lei do Exercício Profissional n. 7498/86, no Capítulo dos Deveres.
- B) No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no Capítulo das Obrigações, da Resolução COFEN n. 564/2017.
- C) Na Lei do Exercício Profissional n. 7498/86, no artigo das Atividades de Enfermagem.

- D) No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no Capítulo das Proibições, da Resolução COFEN n. 564/2017.**
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

10. Em casos de paciente que apresentam sinais e sintomas de Dengue, deve constar, impreterivelmente nas ações da Enfermagem durante o exame físico, a prova do laço, importante para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois é a única manifestação hemorrágica de Febre Hemorrágica da Dengue, representando a fragilidade capilar. Assinale a alternativa que não corresponde corretamente as fases do procedimento da prova do laço:

- A) Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor da falange distal do polegar) no antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial (deitada ou sentada).
- B) Calcular o valor médio: (Pressão Arterial Sistêmica + Pressão Arterial Diastólica)/2.
- C) Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por quinze minutos em adultos (em crianças, 3 minutos) ou até o aparecimento de petéquias ou equimoses.**
- D) Contar o número de petéquias no quadrado.
- E) A prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias no quadrado em adultos e 10 ou mais em crianças.

11. As precauções de isolamento são diretrizes criadas para evitar a transmissão de micro-organismos nos hospitais. Além das precauções padrão, usar as precauções contra a transmissão pelo ar para pacientes comprovadamente (ou suspeitos) portadores de doenças graves transmitidas por aerossóis (partículas de tamanho menor ou igual a 5 micra), que permanecem suspensas no ar e podem ser dispersadas a longas distâncias são necessárias. Estas partículas alcançam rápida dispersão no ar e a maioria permanece em suspensão (aerossol) por períodos prolongados, podendo ser inaladas por um hospedeiro suscetível. Os exemplos dessas doenças incluem:

- A) Sarampo, Varicela, Tuberculose**
- B) Sarampo, Conjuntivite, Tuberculose
- C) Pneumonia, Tuberculose, Influenza
- D) Tétano, Sarampo, Tuberculose
- E) Caxumba, Conjuntivite, Tuberculose

12. A meta terapêutica para o tratamento do diabetes consiste em atingir os níveis glicêmicos normais (euglicemia), sem hipoglicemia, enquanto mantém uma alta qualidade de vida. O tratamento do diabetes possui cinco componentes básicos:

Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Processo Seletivo Público Simplificado n.º 001/2020 - Prova de Enfermagem

A) Terapia Nutricional (dieta), Exercício, Monitoração, Higiene Corporal, Terapia Farmacológica (medicamentos).
B) Terapia Nutricional (dieta), Exercício, Monitoração, Terapia Farmacológica (medicamentos), Controle do Estresse.

C) Terapia Nutricional (dieta), Exercício, Monitoração, Terapia Farmacológica (medicamentos), Educação.

D) Terapia Nutricional (dieta), Exercício, Diálise, Monitoração, Terapia Farmacológica (medicamentos).

E) Terapia Nutricional (dieta), Exercício, Monitoração, Cateterismo, Terapia Farmacológica (medicamentos).

13. Maus tratos infantis incluem abuso ou negligência física intencional, abuso ou negligência emocional e abuso sexual. Uma combinação de sinais e sintomas ou um padrão de lesão deve levantar suspeita da equipe de saúde. São sinais de alerta de abuso, exceto:

A) Resposta inadequada a criança, especialmente uma criança mais velha, como não querer ser tocada ou olhar para o cuidador antes de responder às perguntas.

B) Histórias condizentes sobre o acidente/trauma.

C) Lesão atribuída à irmãos ou a outra pessoa.

D) Uma queixa inicial não associada aos sinais e sintomas presentes.

E) Evidências físicas de abuso ou negligência, incluindo lesões antigas.

14. A sífilis congênita é uma doença transmitida para a criança durante a gestação (transmissão vertical), por isso é importante fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal e, quando o resultado for positivo (reagente), tratar corretamente a mulher e o parceiro sexual para evitar a transmissão. A sífilis pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros dois anos de vida da criança. Assinale a alternativa que não faz parte das complicações padrões da sífilis congênita:

A) Surdez

B) Cegueira

C) Anafilaxia

D) Pneumonia

E) Deficiência Mental

15. A escala de Coma de Glasgow é utilizada para medir objetivamente o nível de consciência através de uma escala numérica, onde o paciente deve estar em seu maior estado de alerta possível antes do teste. As pontuações mínima e máxima variam entre:

A) 3 à 14

B) 3 à 15

C) 3 à 16

D) 3 à 17

E) 3 à 18.

16. A Norma Regulamentadora (NR) 32, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção a segurança e a saúde dos trabalhadores nos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Baseado na NR32, Anexo 1, os agentes biológicos são classificados em classes. Assinale a alternativa de qual classe representa risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia e tratamento.

A) Classe Risco 1

B) Classe Risco 2

C) Classe Risco 3

D) Classe Risco 4

E) Classe Risco 5

17. "Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída. Ouvindo sua queixa, considerando suas preocupações e angústias, fazendo uso de uma escuta qualificada que possibilite analisar a demanda e, colocando os limites necessários, garantir atenção integral, resolutive e responsável por meio do acionamento/articulação das redes internas dos serviços (visando à horizontalidade do cuidado) e redes externas, com outros serviços de saúde, para continuidade da assistência quando necessário." No glossário do Programa HumanizaSus, a frase entre aspas refere-se a:

A) Apoio institucional

B) Integralidade

C) Grupo de trabalho de Humanização

D) Acolhimento

E) Usuário, cliente, paciente

18. A Resolução COFEN 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambiente

Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Processo Seletivo Público Simplificado n.º 001/2020 - Prova de Enfermagem

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Correlacione cada etapa do PE e assinale a letra que corresponde a sequência correta do Processo de Enfermagem:

- A) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva se alcançar os resultados esperados.
- B) Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
- C) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- D) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
- E) Determinação dos resultados que se espera alcançar, e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnostico de Enfermagem.

- (C) Coleta de dados de enfermagem
- (A) Diagnostico de Enfermagem
- (E) Planejamento de Enfermagem
- (B) Implementação
- (D) Avaliação de Enfermagem

- A) C, A, E, B, D
- B) A, C, B, D, E
- C) B, A, C, E, D
- D) C, E, B, A, D
- E) D, A, E, B, D

19. Para fins de controle de infecção, o Centro Cirúrgico é dividido em áreas crítica, semicrítica e não critica. Assinale a alternativa incorreta relacionada a esse tema:

- A) Áreas não críticas são aquelas cuja circulação de pessoas é livre, não exigindo cuidados especiais e nem uso de uniforme privativo.
- B) São consideradas áreas não críticas: elevadores, corredores externos que levam ao Centro Cirúrgico, vestiários e locais de transferência de macas.
- C) Áreas semicríticas permitem a circulação de pessoal e de equipamentos, desde que não interfira no controle e na manutenção da assepsia cirúrgica.
- D) Áreas críticas são as que possuem limites definidos para circulação de pessoal e de equipamentos, com rotinas próprias para controlar e manter a assepsia local.
- E) Nos ambientes considerados áreas semicríticas, além do uniforme privativo, é necessário o uso de gorro/touca e de máscara, cobrindo a boca e o nariz.

20. De acordo com a Rede de Atenção Psicossocial, os “Hospitais Gerais, têm o intuito de atender as crises agudas dos pacientes, onde o tempo de internação não deve ser superior a 7 dias”, portanto eles se enquadram em qual categoria da rede.

- A) Atenção ambulatorial;
- B) Consultório de rua;
- C) Atendimento em centros de atenção psicossocial;
- D) Atendimento de urgência e emergência;
- E) Política de Redução de Danos.